

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | |
|--------|-------------------|
| レジメン名称 | 外科 BEV+TAS-102 療法 |
| 疾患名 | 結腸・直腸癌 |
| 診療科名 | 外科 |
| 登録医師名 | 宮宗 秀明 |

臨床区分

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 |
| <input type="checkbox"/> 治験 |

抗癌剤適応分類

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 局所療法 |
| <input type="checkbox"/> その他 |

| | |
|--------|------------|
| 登録日 | 2017年11月1日 |
| 1クール期間 | 28日 |
| 実施回数 | /回 |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | 注意コメント |
|----|------------|-------|----------------------|------|-----|-------|------|---|------|------|------|------|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|---|---|
| | | | | | | | day1 | — | day5 | day6 | day7 | day8 | — | day12 | day13 | day14 | day15 | — | day28 | | |
| 1 | ロンサーフ配合錠 | 35 | mg/m ² /回 | 経口 | | | ● | → | ● | 休 | 休 | ● | → | ● | 休 | → | → | → | 休 | 1日2回 朝夕食後 5日間連続服用したのち2日間休薬し、 これを2回繰り返す。その後2週間休薬 | |
| 2 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 血管確保用 |
| 3 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | 90min | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ※day1-5、day8-12にロンサーフが 処方されているか確認すること ※初回90min 忍容性があれば、2回目 60min 3回目以降30minまで短縮可 |
| | ペバシズマブ点滴静注 | 5 | mg/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考欄

day8,15,22は血液検査の実施を行うことが望ましい

文献

TAS-102 plus bevacizumab for patients with metastatic colorectal cancer refractory to standard therapies(C-TASK FORCE):an investigator-initiated,open-label,single-arm,multicentre,phase1/2 study

減量・中止基準

休薬の目安；好中球1000/mm³未満
 減量の目安；好中球500/mm³未満
 TAS-102；1段階減量 30mg/m²/回
 2段階減量 25mg/m²/回
 最低用量 20mg/m²/回