

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・内分泌外科 (臨) Dose-dense PTX療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2016年8月5日
疾患名	乳癌		<input type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input checked="" type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	14日
診療科名	乳腺・内分泌外科				実施回数	4/回
登録医師名	三好 和也					

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パクリタキセル投与開始30分前までに内服
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レスタミンと同時投与(レスタミン内服不可患者には医師に確認)
	デキササート注射液 6.6mg	3	瓶															
	ファモチジン静注 20mg	1	管															
4	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	175	mg/m ²															
6																		

備考欄

※(臨) Dose-dense EC療法 4J-3施行後より開始すること。
 ※PTX療法施行後、day2~day4以内に7-エタ皮下注3.6mg 皮下投与
 ※投与量計算は登録時の体表面積に基づき決定する。投与期間中に10%以上の体重増減が認められた場合は再計算を行う。

文献

SBP-09 早期乳癌患者におけるDose-Dense ACまたはEC→パクリタキセルの有効性、安全性を検討する第II相試験

減量基準

※EPI、CPA、PTX減量基準
 1) Grade3以上の発熱性好中球減少症 2) Grade4白血球減少 (<1,000/mm³)
 3) Grade3以上の血小板減少症 (50,000/mm³以下) 4) Grade3以上の貧血 (Hb 6.0-8.5g/dL)
 5) 他 Grade3以上の非血液毒性 (JCOG版 CTCAE-ver4.0に基づく)

※EPI : (Ⅱ) 90mg/m² → (Ⅰ) 80mg/m² → (Ⅱ) 70mg/m²
 ※CPA : (Ⅱ) 600mg/m² → (Ⅰ) 600mg/m² → (Ⅱ) 600mg/m²
 ※PTX : (Ⅱ) 175mg/m² → (Ⅰ) 160mg/m² → (Ⅱ) 145mg/m²