

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・内分泌外科 3週毎 PER + TRA+ VNR療法
疾患名	乳癌
診療科名	乳腺・内分泌外科
登録医師名	高橋 寛敏

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2016年11月9日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	day8	-	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) 初回投与時のみ840mg (2回目以降420mg) ※初回投与の忍容性が良好であれば、投与時間30minまで短縮可能 2) 投与終了後、60分の経過観察を行う。 ※初回投与の忍容性があれば、観察期間は30minまで短縮可能
	パージェタ点滴静注 420mg	840	mg/body														
3	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) 初回投与時のみ8mg/kg (2回目以降6mg/kg) ※初回投与の忍容性が良好であれば、投与時間30minまで短縮可能
	トラスツスマブ点滴静注用	8	mg/kg														
4	生理食塩液	1	袋	点滴静注	メイン	15min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	クラニセトロン点滴静注液3mgバック デキサメトゾン注射液 6.6mg	1	瓶														
5	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン	全開	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	ロゼウス静注液	25	mg/m ²														
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン	全開	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	静脈炎予防の為ロゼウス終了後全開で全量投与すること

備考欄

※JBCRG M05 (PRECIOUS) 試験を行う場合

★ハーゼタ：何らかの理由により、予定された投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満のときには、維持投与量 420 mgを投与する。前回投与日から6週間以上のときには、初回投与量の840 mgで投与を行い、以降は維持投与量 420 mgを3週間隔で投与する。(添付文書と同様)

★ハーセプチン：何らかの理由により、予定された投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満のときには、維持投与量 6 mg/kg を投与する。前回投与日から6週間以上のときには、初回投与量の8 mg/kg で投与を行い、以降は維持投与量 6 mg/kg を3週間隔で投与する。(添付文書と異なる。)

減量・中止基準

※JBCRG M05 (PRECIOUS) 試験を行う場合は、臨床研究実施計画書に沿って減量・中止を行うこと。

文献