

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・甲状腺外科 3週毎 PER + TRA+ weekly PTX療法
疾患名	乳癌
診療科名	乳腺・甲状腺外科
登録医師名	野村 長久

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2013年11月1日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	day8	-	day15	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) 初回投与時のみ840mg (2回目以降420mg) ※初回投与の忍容性が良好であれば、投与時間30minまで短縮可能 2) 投与終了後、60分の経過観察を行う。 ※初回投与の忍容性があれば、観察期間は30minまで短縮可能
	パージェタ点滴静注 420mg	840	mg/body														
3	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) 初回投与時のみ8mg/kg (2回目以降6mg/kg) ※初回投与の忍容性が良好であれば、投与時間30minまで短縮可能
	トラスツスマブ点滴静注用	8	mg/kg														
4	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	パクリタキセル投与開始30分前までに内
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	レスタミンと同時投与 (レスタミン内服不可患者には医師に確認)
	ファモチジン注射液 20mg	1	管														
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
6	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	-	●	-	●	-	-	-	-		
7	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	80	mg/m2														
8																	

備考欄

減量・中止基準

文献

A Phase II study of Pertuzumab, trastuzumab, and weekly paclitaxel in patients with HER2-overexpressing metastatic breast cancer(MBC)