

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| レジメン名称 | 乳腺・内分泌外科 3週毎 TRA + DTX療法 |
| 疾患名    | 乳癌                       |
| 診療科名   | 乳腺・内分泌外科                 |
| 登録医師名  | 高橋 寛敏                    |

臨床区分

|  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究         |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究         |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究         |
| <input type="checkbox"/> 治験              |

抗癌剤適応分類

|   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法               |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法               |
| <input type="checkbox"/> 局所療法                 |
| <input type="checkbox"/> その他                  |

|        |            |
|--------|------------|
| 登録日    | 2016年11月9日 |
| 1クール期間 | 21日        |
| 実施回数   | /回         |

| Rp | 薬品名称               | 標準投与量   | 単位                | 投与方法 | ルート | 投与時間  | 投与日  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 注意コメント |  |
|----|--------------------|---------|-------------------|------|-----|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|
|    |                    |         |                   |      |     |       | day1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |        | -  |
| 1  | 生理食塩液              | 100     | mL                | 点滴静注 | メイン |       | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | 血管確保用  |
| 2  | グラニセトロン点滴静注液3mgパック | 1       | 袋                 | 点滴静注 | 側管  | 30min | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      |  |
|    | デキサメトゾン注射液 6.6mg   | 2       | 瓶                 |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |  |
| 3  | 5%糖液               | 500     | mL                | 点滴静注 | 側管  | 90min | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      |  |
|    | ドセタキセル点滴静注液        | 75      | mg/m <sup>2</sup> |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |  |
| 4  | 生理食塩液              | 250     | mL                | 点滴静注 | 側管  | 90min | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | 初回投与時のみ8mg/kg<br>2回目以降6mg/kg<br>初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで短縮可能 |
|    | トラスツスマブBS点滴静注用     | 8       | mg/kg             |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |  |
| 5  |                    |         |                   |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |  |
|    |                    | 2回目以降：6 | mg/kg             |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |  |

備考欄

※JBCRG M05 (PRECIOUS) 試験を行う場合  
 ★ハーセプチン：何らかの理由により、予定された投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満のときには、維持投与量 6 mg/kg を投与する。前回投与日から6週間以上のときには、初回投与量の8 mg/kg で投与を行い、以降は維持投与量 6 mg/kg を3週間隔で投与する。（添付文書と異なる。）

減量・中止基準

※JBCRG M05 (PRECIOUS) 試験を行う場合は、臨床研究実施計画書に沿って減量・中止を行うこと。

文献

|  |
|--|
|  |
|--|