

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・甲状腺外科 3週毎トシタゾP+PTX療法
疾患名	乳癌
診療科名	乳腺・甲状腺外科
登録医師名	野村 長久

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年12月1日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
	デキサート注射液 6.6mg	3	瓶															
	ファモチジン注射液 20mg	1	管															
4	グラセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5%糖液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	フィルター付き点滴セット使用 パクリタキセル濃度（0.3～1.2mg/mL）になるように調製（液量
	パクリタキセル注	80～210	mg/m <sup>2</sup>															
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初回投与時のみ8mg/kg 2回目以降6mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで短縮可能
	トラスツスマブBS点滴静注用	8	mg/kg															
		2回目以降：6	mg/kg															
7																		

備考欄

減量・中止基準

文献