国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

		N PTX (9	PTX (90mg/m²) +BEV療法				臨床区分			_	抗癌剤適応分類				登卸	禄日	2012年12月1日	
		乳癌					_	☑ 日常診	療			□ 進行・	再発化学	療法				
診療科名		乳腺•甲状腺外科						□ 単施設	自主研究			□ 術後化	/学療法			1 /7	II #088	28⊟
		野村長久						□ 他施設自主研究				□ 術前化学療法		•	1クール期間		200	
			<u> </u>				□ 市販後	臨床研究			□ 局所療	法					/6	
							□治験				□その他	ь			美施	回数	/0	
Rp 薬品名称 標準投与量		単位 投与方法 ルート		п Г	投与時間				ı							き辛ついい		
нр					投号刀法	ルート	技士时间	day1	_	_	day8	_	_	day15	_	_	_	注意コメント
4	レスタミンコ	コーワ錠 10mg	5	錠	経口				_	_		_	_					パクリタキセル投与開始30分前までに内
1					在 一			•		_		_	_		_	_	_	
	生理食塩液		100	mL														血管確保用
2					点滴静注	メイン		•	_	_		_	_		_	_	_	※開始から終了までECGモニターを 装着すること
	生理食塩液		100	mL														レスタミンと同時投与(レスタミン内服)
3	デキサート注	È射液 6.6mg	1	瓶	点滴静注	側管	15min		_	_		_	_		_	_	—	不可患者には医師に確認)
	ファモチジン	/注射液 20mg]ン点滴静注液3mgバック	1	管														
4	グラーゼトレ	Jノ 点 制 静 注 液 3 m g ハック	11	袋	点滴静注	側管	30min						_		_	_	_	
_					- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	N E	30111111											
	生理食塩液		250	mL				_			_							フィルター付き点滴セット使用
5	パクリタキも	マル注	90	mg/m2	点滴静注	側管	60min	•	_	_		_	_	•	_	_	_	
	生理食塩液		100	mL														初回90min、忍容が確認できれば、2回
6	アバスチン点	京商静注用 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	10	mg/kg	点滴静注	側管	90min		_	_	_	_	_		_	_	_	目60min、3回目以降 30minに変更
																		可
7																		
'					-													
8			ļ 		-													
							1											
9					-													
			·		-													
4.0			·															
10																		
11																		
12			 		-													
12					-													
														1				
備考標	Ĭ.							減量・中止基準										1
]	
之献																		