

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | |
|--------|-----------------------|
| レジメン名称 | 乳腺・甲状腺外科 weekly PTX療法 |
| 疾患名 | 乳癌 |
| 診療科名 | 乳腺・甲状腺外科 |
| 登録医師名 | 野村 長久 |

| |
|--|
| 臨床区分 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 |
| <input type="checkbox"/> 治験 |

| |
|------------------------------------|
| 抗癌剤適応分類 |
| <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 局所療法 |
| <input type="checkbox"/> その他 |

| | |
|--------|------------|
| 登録日 | 2012年12月1日 |
| 1クール期間 | 7日 |
| 実施回数 | /回 |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | 注意コメント | |
|----|-------------------|--------|-------------------|------|-----|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------------------------|
| | | | | | | | day1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1 | レスタミンコーワ錠 10mg | 5 | 錠 | 経口 | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パクリタキセル投与開始30分前までに内 |
| 2 | 5%糖液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること |
| 3 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | 側管 | 15min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認） |
| | デキサート注射液 6.6mg | 1 | 瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ファモチジン注射液 20mg | 1 | 管 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | グラセトロン点滴静注液3mgパック | 1 | 袋 | 点滴静注 | 側管 | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 5%糖液 | 250 | mL | 点滴静注 | 側管 | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | フィルター付き点滴セット使用 |
| | パクリタキセル注 | 80~100 | mg/m ² | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考欄

減量・中止基準

文献