

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	脳外科 初発/TMZ+BEV+放射線併用期(6週間)療法
疾患名	悪性神経膠腫
診療科名	脳外科
登録医師名	守山 英二

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2017年5月31日
1クール期間	70日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	day15	-	day29	-	day42	day43	-	-	
1	テモダールカプセル	75	mg/m ²	経口		空腹時	●	→	→	→	→	→	→	休			備考欄参照
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	●	-	●	-	-	-			血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min※	●	-	●	-	●	-	-	-			TEV-01D が処方されているか確認すること ※初回の忍容性がよければ2回目は60分、2回目の忍容性がよければ3回目以降は30分
	アバサチン点滴静注用	10	mg/kg														
4																	

備考欄
TEV-01D (75mg/m²) 1×空腹時 42日間 継続内服
RT開始日にBEV,TEV-01D 投与開始とする
RT終了日にBEV,TEV-01D 最終投与
放射線療法が延期される場合、TEV-01D は最大49日間継続投与可能

減量・中止基準

文献