

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 Herceptin+TS-1+CDDP療法 (S.hydration)		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2013年8月15日	
疾患名	胃癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	21日	
診療科名	外科				実施回数	/回	
登録医師名	磯田 健太						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	—	—	—	day14	—	—	—	
1	S-1	80~120	mg	経口			●	→	→	→	→	→	休				備考欄参照
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	ソルデム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	ソルアセトD輸液 デキサート注射液 6.6mg	500 0.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	ソルデム3A輸液 デキサート注射液 6.6mg	500 0.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
6	生理食塩液 アロキン静注用0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	生理食塩液 トラスツズマブ注射用	250 6~8	mL mg/kg	点滴静注	メイン	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回投与時のみ8mg/kg 2回目以降 6mg/kg 初回：90min 2回目以降：30minも可
9	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	適宜 60	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1) TS-1 が処方されているか確認すること 2) 全量500mLに調製
10	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
11	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
12																	

備考欄

TS-1 2×(14)MA 内服処方
 1.25m²未満 80mg/日、1.25m²以上1.5m²未満 100mg/日、
 1.5m²以上 120mg/日

減量・中止基準

--

文献

--