

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 PTX+TS-1療法
疾患名	胃癌
診療科名	外科
登録医師名	常光 洋輔

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	21日
実施回数	2/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	day8	-	day14	-	-	-	-	-	
1	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口			●	→	→	→	休						
2	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	パクリタキセル投与開始30分前までに内
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
4	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg パチカ <sup>®</sup> 静注 20mg	100 1 1	mL 瓶 管	点滴静注	側管	15min	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
5	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
6	生理食塩液 パクリタキセル注	250 60	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	60min	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	フィルター付き点滴セット使用 TS-1が処方されているか確認すること
7																	

備考欄

減量・中止基準

文献